

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。  
また必要なときに読めるよう大切に保存して下さい。

第2類医薬品

543

## 五苓散料エキス散〔勝昌〕



### 使用上の注意

漢方薬は原則として随証的方法と云って体質や病状などを参考に使用します。  
しかし、正しく判断することは漢方に慣れていないと非常に難しいものです。  
そこで医師、薬剤師又は登録販売者とよく相談して薬を正しく使用して下さい。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【効能・効果】 次のような症状に有効です。

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：  
水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

### 〈効能・効果に関連する注意〉

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことです。

### 【用法・用量】

下記の量を空腹時に水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい。

1回量	1日服用回数
1.5g(添付のスプーンで1杯)	3回

### \*\*【成分・分量】

五苓散料エキス散〔勝昌〕は漢方処方に従って生薬を配合し抽出して得た水製エキスに賦形剤を加えて散剤としたものです。

本品4.5g中

日局タクシャ・・・5.0g 日局チヨレイ・・・3.0g  
日局ビャクジュツ・・・3.0g 局外生規ケイシ・・・2.0g  
日局ブクリヨウ・・・3.0g

上記の混合生薬より抽出した五苓散料水製エキス(「漢方処方応用の実際」)2.4gを含有しています。

添加物(賦形剤)としてトウモロコシデンプンを含有しています。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる)

### 【お問い合わせ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・販売店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元 株式会社 東洋薬行 お客様相談係  
受付時間:午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)  
〒113-0033 東京都文京区本郷6-19-7  
電話(03)3813-2263 FAX(03)3813-0202

# 株式会社東洋薬行

東京都文京区本郷6-19-7